




**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220030, г. Мінск
тэл. (+375 17) 337 70 84, факс (+375 17) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: kanc@minzdrav.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
УНП 100049892

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск
тел. (+375 17) 337 70 84, факс (+375 17) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: kanc@minzdrav.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
УНП 100049892

16.12.2024 № 2-18/К-431-10
На № _____



О рассмотрении обращения

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав) рассмотрело Ваше электронное обращение и по существу заданного вопроса сообщает следующее.

В Республике Беларусь вакцинация против ротавирусной инфекции не предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок (далее – Национальный календарь) и Перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (далее – Перечень), установленными постановлением Минздрава от 17.05.2018 № 42 «О профилактических прививках» и осуществляется организациями здравоохранения и медицинскими центрами за счет собственных средств граждан.

В настоящее время в регионах для проведения профилактических прививок против ротавирусной инфекции на платной основе имеется в наличии вакцина, которая в соответствии с инструкцией по медицинскому применению показана для иммунизации детей в возрасте от 6 до 32 недель.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, изложенной в Еженедельном эпидемиологическом бюллетене 301 Ротавирусные вакцины: документ по позиции ВОЗ – июль 2021 г. (от 16 июля 2021 года, 96-й том, № 28, 2021, 96, 301-320), включение вакцинации против ротавирусной инфекции в национальные программы иммунизации целесообразно в странах с высоким уровнем смертности от

данной инфекции (страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также страны Африки, расположенные к югу от Сахары).

Проведение плановой вакцинации детей первого года жизни в вышеуказанных странах позволяет снизить уровень возникновения тяжелых форм течения ротавирусных гастроэнтеритов на 48-69%, а, соответственно, снизить уровень смертности среди детей первого года жизни.


Справочно:

За последние 6 лет в Республике Беларусь показатель заболеваемости варьировал в пределах от 22,6 до 62,8 на 100 тысяч населения. Количество тяжелых случаев ротавирусной инфекции за последние 6 лет – 0,4% от всех случаев заболевания.

Учитывая отсутствие смертности от ротавирусной инфекции в Республике Беларусь, а также доступность получения квалифицированной медицинской помощи, в том числе в стационарных условиях, на всей территории страны, включение вакцинации против данной инфекции в Национальный календарь и Перечень в настоящее время нецелесообразно. Ключевой мерой профилактики ротавирусной инфекции является соблюдение правил личной гигиены.

Настоящий ответ может быть обжалован в порядке, определенном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Заместитель Министра



А.Г.Старовойтов